



GEEN OPERATIE

METADOIOPLASTIE

FALLOPLASTIE

WAT

- ▲ Kleine penis gevormd door het losmaken en strekken van de clitoris die soms gegroeid is door testosteron
- ▲ Balzak gevormd uit de grote schaamlippen

- ▲ Penis gevormd uit de huid van de voorarm of het dijbeen/lies
- ▲ Balzak gevormd uit de grote schaamlippen

VOORWAARDEN

- ▲ Geen voorwaarden

- ▲ + 18 jaar
- ▲ Goede gezondheid: o.a. niet roken, BMI tussen 18 – 30 kg/m², plasfunctie in orde
- ▲ Minimum 12 maanden hormoonbehandeling
- ▲ Baarmoederverwijdering en verwijdering van vagina worden geadviseerd om medische redenen
- ▲ Bij falloplastie: epilatie van de arm/been > 4 weken op voorhand wordt aangeraden

LITTEKEN

- ▲ Geen litteken

- ▲ Geen opvallend litteken

- ▲ Groot zichtbaar litteken op de voorarm of het dijbeen
- ▲ Soms ervaring van stigma door het litteken

SEKSUALITEIT

- ▲ Seksueel gevoel blijft 100% behouden
- ▲ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
- ▲ Penetratie van partner mogelijk met externe hulpmiddelen
- ▲ Mogelijkheid om vaginaal gepenetreerd te worden

- ▲ Door gebruik van het eigen genitaal weefsel, blijft het erotisch gevoel behouden
- ▲ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
- ▲ Natuurlijke erectie bij seksuele opwinding
- ▲ De lengte is heel variabel, wel te klein om te penetreren
- ▲ Vaginaal gepenetreerd worden niet meer mogelijk

- ▲ Clitoris bevindt zich onderhuids wat kan leiden tot verschil in gevoeligheid
- ▲ Mogelijkheid tot orgasme blijft behouden
- ▲ Geen penetratie mogelijk zonder erectieprothese of hulpmiddelen
- ▲ De penis heeft een meer realistische grootte en uiterlijk
- ▲ Vaginaal gepenetreerd worden niet meer mogelijk

PLASSEN

- ▲ Zittend plassen of staand met een hulpmiddel (zoals plastuit)

- ▲ Staand plassen meestal niet mogelijk zonder hulpmiddelen

- ▲ Staand plassen zonder hulpmiddelen

COMPLICATIES

GEEN OPERATIE

- ▲ Geen risico op complicaties

METADOIOPLASTIE

- ▲ Kans op complicaties tijdens de operatie tot 40%
- ▲ Bijkomende operatie nodig bij 50% van de personen

MEEST VOORKOMEND:

- Problemen aan de plasbuis: nadruppelen en straal problemen (fistel, vernauwing)

MINDER VOORKOMEND:

- Wondproblemen, nabloedingen en infecties

ZELDEN (<5%):

- Bij verwijdering van de vagina, risico op het beschadigen van de darmwand en de blaaswand

FALLOPLASTIE

- ▲ Kans op complicaties tijdens operatie tot 40%
- ▲ Bijkomende complicaties mogelijk op de penis en op de donorplaats (arm/been)
- ▲ Bijkomende operatie nodig bij 50% van de personen

MEEST VOORKOMEND:

- Problemen aan de plasbuis: nadruppelen en straal problemen (fistel, vernauwing)

MINDER VOORKOMEND:

- Wondproblemen, infecties... ter hoogte van de plaats waar de huidflap werd weggenomen
- Nabloedingen en infecties

ZELDEN (<5%):

- Het verlies van de huidflap
- Kans op gedeeltelijk of geheel afsterven van de penis
- Bij verwijdering van de vagina, risico op het beschadigen van de darmwand en de blaaswand

KOSTPRIJS

- ▲ Gratis, behalve eventuele hulpstukken zoals penis prothesen die variëren tussen 30 – 250 euro

- ▲ Eigen bijdrage ongeveer 1000 euro

- ▲ Epilatie voorarm/been: 80 tot 250 euro per sessie
- ▲ Eigen bijdrage minstens 3500 euro
- ▲ Eventueel erectieprothese die varieert tussen 1700 en 6000 euro

OPNAMEDUUR EN NAZORG

- ▲ Geen ziekenhuisopname

- ▲ Gemiddeld 7 dagen opname in het ziekenhuis
- ▲ Nazorg/herstelperiode: 6 weken
- ▲ Werkonbekwaamheid voor zwaarder fysiek werk tot 1 maand

- ▲ Gemiddeld 2,5 weken opname in het ziekenhuis
- ▲ Nazorg/herstelperiode: 6 tot 8 weken
- ▲ Werkonbekwaamheid voor zwaarder fysiek werk tot 3 maanden